

GABARITO DO PROCESSO SELETIVO LAP 2020

1. Sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta:

- a) A descentralização associada ao comando único em cada esfera de governo reforça a importância do nível federal na definição das políticas de saúde e na gestão do sistema, cabendo aos estados e municípios apenas a execução dessas políticas.
- b) Com o princípio da universalidade, o financiamento dos serviços de saúde é de responsabilidade de toda a sociedade, havendo distinção no acesso conforme as condições socioeconômicas da população.
- c) A participação da comunidade ocorre através das entidades representativas, garantindo que a população participe do processo de formulação de diretrizes e prioridades para a política de saúde, da fiscalização do cumprimento dos dispositivos legais e normativos do SUS e do controle e avaliação de ações e serviços de saúde.**
- d) A equidade consiste num conjunto articulado e contínuo de ações e serviços exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

2. De acordo com a Lei 8.080 de 1990, o “conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos” refere-se à(ao):

- a) Vigilância epidemiológica.**
- b) Vigilância sanitária.
- c) História natural da doença.
- d) Promoção e Prevenção.

3. Assinale a alternativa correta:

- a) Na expiração, os principais músculos responsáveis por puxar a caixa torácica para baixo são reto abdominal e intercostais externos.
- b) A pressão pleural é ligeiramente negativa para manter os pulmões abertos em seu nível de repouso e aumenta com a inspiração normal.
- c) A pressão alveolar deve cair para valor ligeiramente abaixo da pressão atmosférica no momento de inspiração e aumentar durante a expiração.**
- d) O surfactante é um agente capaz de reduzir a tensão superficial da água e é composto principalmente por dipalmitoilfosfatidilcolina, apoproteínas surfactantes e os íons potássio.

4. Sobre os canais iônicos presentes na membrana pós-sináptica, assinale a alternativa correta:

- a) O íon sódio é o único que passa pelos canais catiônicos quando eles se abrem.
- b) Os canais catiônicos possuem cargas positivas em seu revestimento e a abertura destes excita o neurônio.
- c) Os canais aniônicos permitem a passagem principalmente de íons cloreto e possuem cargas negativas em seu revestimento.
- d) Os neurotransmissores que permitem o influxo de cargas negativas sofrem inibição.**

5. Em relação a anatomia da parede torácica, é correto afirmar que:

- a) A incisura jugular do esterno situa-se a nível da margem superior da vértebra T2
- b) O espaço intercostal é numerado de acordo com a costela inferior a ele
- c) As artérias torácicas internas descem anteriormente à clavícula e à primeira cartilagem intercostal
- d) A veia intercostal superior esquerda passa entre os nervos vago e frênico**

6. Em relação ao pulmão, é correto o que se afirma em:

- a) A inervação do pulmão é feita principalmente pelo plexo pulmonar anterior
- b) Geralmente a artéria bronquial direita se origina indiretamente da aorta**
- c) Na maioria dos casos de hemoptise a hemorragia provém de ramos das artérias pulmonares
- d) As fibras simpáticas do plexo pulmonar são excitatórias para o músculo brônquico

7. A partir da leitura do artigo: “ O psicólogo no hospital geral”, assinale a alternativa correta:

a) O psicólogo nos hospitais gerais vem, ao longo do tempo, tomando o papel do psiquiatra ao invés de atuar em conjunto com ele, o que torna os hospitais um bom mercado de trabalho para o recém formado em psicologia.

b) A formação em psicologia inclui o debate sobre a saúde em seus aspectos políticos, sociais e econômicos. Dessa forma, é muito mais fácil para o psicólogo conseguir se inserir nesse novo mercado de trabalho que é o hospital geral.

c) O psicólogo, no hospital, tem como uma de suas funções, redirecionar o olhar médico para a individualidade de cada paciente, dos aspectos subjetivos do adoecer, humanizando, assim, cada vez mais o atendimento médico.

d) O bom para o psicólogo que quer trabalhar em um hospital é que ele não precisa trabalhar em equipe, já que a atuação profissional dele é solitária.

8. Sobre a fase celular da inflamação aguda, marque a alternativa INCORRETA:

a) A lentificação do fluxo nos vasos sanguíneos oriunda do edema exsudato formado na fase vascular da inflamação aguda aumenta a viscosidade do sangue. Tal estase facilita a migração dos leucócitos do centro do vaso sanguíneo para a periferia, sendo esse processo denominado marginação dos leucócitos

b) Após a marginação dos leucócitos, as células imunes passam a interagir, por meio de integrinas de baixa afinidade, com as selectinas expressas pelo endotélio vascular, realizando um processo de deslocamento nos vasos sanguíneos, guiado por quimiocinas, até o local da inflamação. Esse processo de deslocamento é denominado rolamento

c) Quando os leucócitos chegam ao local da inflamação, os mediadores inflamatórios induzem a transformação das integrinas de baixa afinidade que eles apresentam em integrinas de alta afinidade, promovendo a adesão firme entre as selectinas expressas pelo endotélio e essas integrinas expressas pelos leucócitos

d) Uma vez no interior do tecido, os leucócitos começam a sofrer a influência de citocinas que induzem sua migração em direção ao local onde está o estímulo agressor. Tal processo é denominado transmigração

9. Sobre o artigo: “Fisioterapia motora em pacientes internados na unidade de terapia intensiva: uma revisão sistemática”, assinale a alternativa correta:

a) A imobilidade, o descondicionalismo físico e a fraqueza muscular acabam sendo problemas frequentes e que estão associados à maior incapacidade e à reabilitação prolongada, sendo evitáveis com a fisioterapia hospitalar, na maioria dos casos.

b) A fraqueza muscular do paciente crítico apresenta-se de forma difusa e simétrica, acometendo apenas a musculatura estriada esquelética apendicular.

c) Utilizada por muitos fisioterapeutas, a mobilização precoce deve ser aplicada diariamente nos pacientes críticos internados em UTI que se encontram estáveis. Os que se encontram acamados e inconscientes (sob VM) devem esperar para início da fisioterapia respiratória.

d) Apesar dos resultados benéficos, estudos não conseguiram comprovar que fisioterapia motora precoce diminui o tempo de internação hospitalar.

10. Sobre o artigo: "O enfermeiro e a construção da autonomia profissional no processo de cuidar", assinale a alternativa correta:

a) O processo de autonomia pressupõe que o profissional enfermeiro e a equipe de enfermagem possam interferir no processo de definição das prioridades na assistência, prescrevendo medicações e atuando pela sua experiência profissional.

b) Ao profissional enfermeiro cabe o trabalho intelectual e ao técnico de enfermagem, o trabalho manual, sendo que muitas das vezes isso não é cumprido, ficando a cargo da equipe da enfermagem decidir as funções de cada um.

c) A enfermagem só poderá adquirir plena autonomia quando o cuidado passar a ser visto como uma esfera privilegiada na área da saúde, tanto do ponto de vista científico como prático.

d) A enfermagem, diferentemente de outras áreas do hospital, consegue atuar por conta própria, fora de uma equipe multidisciplinar e, por isso, é a área hospitalar que mais funciona.

11. Hipertensão pulmonar é definida como a consequência hemodinâmica de alterações vasculares, de etiologia variada que ocorrem no território pulmonar. Quantitativamente, define-se hipertensão pulmonar por meio da pressão média da artéria pulmonar medida pelo cateterismo cardíaco direito. Marque a alternativa na qual está descrita a definição correta de hipertensão pulmonar.

- a) Pressão da artéria pulmonar média acima de 20 mmHg no repouso ou maior que 30 mmHg no exercício.
- b) Pressão da artéria pulmonar média acima de 25 mmHg no repouso ou maior que 35 mmHg no exercício.
- c) Pressão da artéria pulmonar média acima de 25 mmHg no repouso ou maior que 30 mmHg no exercício.**
- d) Pressão da artéria pulmonar média acima de 20 mmHg no repouso ou maior que 35 mmHg no exercício.

12. A Organização Mundial da Saúde classifica a hipertensão pulmonar em 5 grupos, com base em sua etiologia. Considerando essa classificação, marque a alternativa que apresenta a etiologia classificada como propensa a apresentar hipertensão arterial pulmonar.

- a) DPOC
- b) Sarcoidose
- c) Trombose crônica

d) Hipertensão pulmonar idiopática esporádica

13. O exame físico é extremamente útil para o diagnóstico de hipertensão pulmonar e sua possível causa. Quanto às alterações no exame físico de pacientes com hipertensão pulmonar marque a alternativa CORRETA:

- a) A redução na intensidade do componente pulmonar da segunda bulha cardíaca é o sinal mais consistente.
- b) Estase jugular e o sopro de insuficiência tricúspide e de insuficiência pulmonar são achados secundários à hipertensão pulmonar.**
- c) Sinais de hepatopatia crônica são exclusivos da etiologia esquistossomótica de hipertensão pulmonar.
- d) A síndrome de baixo débito está associada às causas cardíacas de hipertensão pulmonar.

14. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a esquistossomose acomete perto de 200 milhões de pessoas em 76 países. Com base na epidemiologia dessa parasitose, marque a alternativa CORRETA:

- a) A esquistossomose, no Brasil, também é conhecida como “Barriga d’água”, “Xistose” ou “Bilharziose”.**
- b) Acomete principalmente indivíduos dos estados do Sudeste e Centro-Oeste.
- c) A notificação é compulsória em todas as regiões do país.
- d) A esquistossomose não pode ser considerada um indicativo sócio-econômico relacionado à pobreza, pois acomete indivíduos de todas as classes sociais.

15. Quanto ao ciclo de vida do *Schistosoma mansoni* marque a alternativa CORRETA:

- a) Os miracídios parasitam o hospedeiro definitivo: o caramujo do gênero *Biomphalaria*.
- b) Após a penetração na pele humana os miracídios passam a se chamar cercárias.
- c) No sistema porta ocorre a maturação sexual, originando machos e fêmeas.**
- d) Os ovos são eliminados nas fezes do caramujo.

16. Quanto às formas anatomoclínicas da esquistossomose, marque que a alternativa CORRETA:

- a) Na fase aguda, a penetração da cercária na pele pode ser assintomática.**
- b) A dermatite cercariana é uma reação de sensibilidade em indivíduos que nunca foram infectados.
- c) A febre de Katayama é característica da fase crônica da esquistossomose.
- d) O parasita apresenta sobrevivência curta, o que contribui para o bom prognóstico da doença.

17. Quanto à fase crônica da esquistossomose, marque a alternativa CORRETA:

- a) Dentre as formas ectópicas, a forma pulmonar é a mais grave.
- b) Os graus extremos de gravidade, como ruptura de varizes esofágicas, surgem na fase crônica da doença.**
- c) Ovos e vermes adultos do parasita são encontrados apenas no trato gastrointestinal do indivíduo infectado.
- d) As manifestações clínicas são completamente dependentes da intensidade do parasitismo.

18. Quanto às alterações anatomopatológicas, marque a alternativa CORRETA:

- a) O acometimento hepático e pulmonar são os mais frequentes e importantes.
- b) Na esquistossomose crônica há disseminação miliar de ovos e são observados granulomas necrótico-exsudativos.
- c) Formas hepáticas mais exuberantes produzem a chamada fibrose de Symmers.**
- d) As lesões vasculares são causadas principalmente pelos vermes adultos.

19. A presença de hipertensão pulmonar e cor pulmonale geralmente está associada a um pior prognóstico. Com base nas alterações macroscópicas decorrentes de cor pulmonale, responda a alternativa CORRETA:

- a) Congestão passiva aguda do fígado confere o aspecto macroscópico conhecido como “fígado em noz moscada”.
- b) A hipertensão pulmonar resulta em hipertrofia e dilatação das câmaras cardíacas esquerdas, geralmente não acompanhada de alterações nas câmaras direitas.
- c) Esplenomegalia não está associada ao diagnóstico de hipertensão pulmonar.
- d) Aterosclerose de tronco pulmonar sugere hipertensão acentuada na circulação pulmonar.**

20. Sobre a hipertensão pulmonar crônica agudizada, marque a alternativa CORRETA:

- a) O tromboembolismo pulmonar maciço apresenta baixa mortalidade.
- b) História de dispneia crônica com piora aguda nos últimos dois dias sugere tromboembolismo pulmonar agudo.**
- c) A radiografia de tórax é suficiente para determinar o diagnóstico definitivo de tromboembolismo agudo.
- d) A terapêutica padrão nos casos de tromboembolismo pulmonar maciço é feita com agentes anticoagulantes.